



SU 1803032A1

## Invention description

### METHOD OF WITHDRAWAL SYNDROME TREATMENT IN TOBACCO DEPENDENCE

The invention is in medical field, particularly in narcology, and can be used for tobacco dependency treatment. The method makes it possible to decrease complications and increase efficiency of the treatment due to an increase of the number of convalescents. For this the mouth is being consecutively dewed with chloroethyl, and, in addition chloroethyl vapors are given to inhale for a short period of time, the mouth is dewed with polycarpin hydrochloride 1%, and after 5-6 hours a reflex therapy session is given.

The invention is in medical field, particularly in narcology, and can be used for tobacco dependency treatment.

The purpose of the invention is to decrease complications and increase efficiency of the treatment due to an increase of the number of convalescents.

The goal indicated is achieved by conducting psychotherapy, and then the mouth is being consecutively dewed with chloroethyl, and, in addition chloroethyl vapors are given to inhale for a short period of time and tongue area is dewed with polycarpin hydrochloride 1%.

The method is achieved as follows.

Adjusting and therapeutic psychotherapy is carried out, then the patient is seated comfortably in a chair and their mouth is dewed with 0.3-0.5 ml of chloroethyl, and, in addition chloroethyl vapors are given to inhale for a short period of time, then the face area is dewed with 0.2-0.5 ml of polycarpin hydrochloride 1% for 1-2 seconds, and after 5-6 hours a reflex therapy session is given. The action is directed to the points B-1, B-7, B-8 -4, in-tan (H), -19 and 1-20.

For the reflex therapy session domestic electropuncture apparatus is used, such as "Reflux-3-01", "PEP-1" and others. The current of the action is equal 18-20 uA in the head area, 100 uA in the trunk area.

**E x a m p l e.** Patient K., 36 years old. He/she was smoking since 11 years old, 5-8 cigarettes a day. At treatment the mouth was dewed with 0.5 ml of chloroethyl with subsequent short-term chloroethyl vapors inhalation for 0.5-2 seconds, and then the face area was dewed with 0.2 ml of polycarpin hydrochloride 1% for 1-2 seconds, and then in 5-6 hours a reflex therapy session was given using corporal method.

The patient has not been smoking for 5 months and is under observation.

Patient M., 41 years old, was actively smoking for 8 years old, 12-18 cigarettes a day. A treatment was conducted by the declared method using 0.5 ml of chloroethyl, inhalation of chloroethyl vapors for 0.5-2 seconds and dewing the

face are with 0.5 ml of apomorphine hydrochloride 1% for 1-2 seconds with a subsequent session of reflex therapy.

The patient has not been smoking for 4.5 months and is under observation.

Thus the method is simple in the realization, it does not require expensive equipment and medications. It can find a broad application in specialized institutions.

The invention formulae.

The method of tobacco dependency treatment by conducting psycho- and reflux therapy, which is characterized by the fact that for the purpose of an increase in the therapeutic effectiveness in the treatment, 5-6 hour prior to the reflux therapy, the mouth is subsequently dewed with chloroethyl and its vapors inhalation at the same time, and with polycarpin hydrochloride 1% solution.



СОЮЗ СОВЕТСКИХ  
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ  
РЕСПУБЛИК

(19) SU (11) 1803032 A1

(51) A 61 K 31/02

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАТЕНТНОЕ  
ВЕДОМСТВО СССР  
(ГОСПАТЕНТ СССР)

# ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ



- (21) 4859314/14  
(22) 22.03.90  
(46) 23.03.93, Бюл. № 11.  
(71) Кооператив "Лечебный центр "Ноу-хау"  
(72) С.П.Гарницкий и Л.В.Шугаева  
(56) Авторское свидетельство СССР  
№ 1022708, кл. А 61 Н 35/02, 1982.  
(54) СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ СИНДРОМА ОТМЕ-  
НЫ ПРИ ТАБАЧНОЙ ЗАВИСИМОСТИ  
(57) Изобретение относится к области меди-  
цины, в частности к наркологии, и может

Изобретение относится к медицине, в частности к наркологии, и может быть использовано при лечении влечения к курению.

Целью изобретения является снижение осложнений и повышение эффективности способа за счет увеличения количества выдыхаемых.

Указанная цель достигается путем проведения психотерапии, а затем последовательно орошают полость рта хлорэтилом, причем, дополнительно дают вдыхать кратко-временно пары хлорэтила и орошают область языка пилокарпином гидрохлоридом 1%-ным.

Способ осуществляют следующим обра-  
зом.

Проводят установочную и лечебную психотерапию, а затем пациента усаживают удобно в кресло и орошают полость рта 0,3-0,5 мл хлорэтила, причем дополнительно дают вдыхать кратко-временно пары хлорэтила, затем орошают область лица 1% пилокарпина гидрохлоридом в количестве 0,2-0,5 мл в течение 1-2 секунд, а через 5-6 часов проводят сеанс рефлексотерапии. Воздействие осуществляют на точки В-1, В-7, В-8-4, ин-тан (Н), -19 и 1-20.

быть использовано при лечении влечения к курению. Способ позволяет снизить осложне-  
ния и повысить эффективность лечения за счет увеличения количества выдыхаемых. Для этого последовательно орошают полость рта хлорэтилом, причем дополни-  
тельно дают вдыхать кратко-временно его пары, орошают полость рта пилокарпином гидрохлоридом 1%-ным, а затем через 5-6 ч проводят сеанс рефлексотерапии.

Для проведения сеанса используют оче-  
видный серийно выпускаемый прибор для электропунктуры, например, "Рефлек-  
с-01", "ПЭП-1" и другие. Так, воздействия равен 18-20 мк А в область головы, 100 мк А в области туловища.

Пример. Больной К. 36 лет. Курит с 11 лет, 5-8 сигарет в день. На приеме у врача после проведенного психотерапевтическо-  
го воздействия оросили полость рта 0,3 мл хлорэтила с последующим кратко-временно-  
ным вдыханием паров хлорэтила в течение 0,5-2 с, а затем оросили область лица пило-  
карпином гидрохлоридом 1%-ным в количе-  
стве 0,2 мл в течение 1-2 с, затем через 5-6 ч провели сеанс рефлексотерапии корпо-  
ральным методом.

Пациент не курит 5 месяцев, находится над наблюдением.

Больной М., 41 год, курит активно 8 лет, 12-18 сигарет в день. Проведение лечение  
заявленным методом с применением 0,5 мл хлорэтила, вдыханием в течение 0,5-2 с па-  
ров хлорэтила и орошения лица 0,5 мл апо-  
морфина гидрохлоридом 1%-ным в течение 1-2 с с последующим сеансом рефлексотера-  
пии.

1 A  
2 C  
3 O  
4 S  
5 U  
6 1  
7 N  
8 S  
9 U  
10 1  
11 8  
12 0  
13 3  
14 0  
15 3  
16 2  
17 A  
18 1  
19

SU 1803032 A1